

PRIMA PARTE

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA



2008

2008

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO

SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA

dati relativi all'anno 2008

2008



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Antidroga
Via delle Vite, 13 • 00167 Roma
tel. 06/67796300 • fax. 06/67796443
dipartimentoantidroga@governo.it

Tutti i contenuti di questa pubblicazione
sono scaricabili dal sito:

www.politicheantidroga.it
www.drona.org

Dati generali

- I soggetti tossicodipendenti totali stimati, in Italia, che avrebbero bisogno di trattamento (per l'uso di oppiacei o cocaina) sono circa **385.000**
- **210.000** consumatori di **oppiacei** di cui **123.800 (59%)** in trattamento
- **172.000** consumatori problematici di **cocaina** di cui circa **27.900** in trattamento (16,2%).

I.1. CONSUMO DI DROGA

Uso di sostanze almeno una volta nella vita

popolazione generale (15-64 anni) - IPSAD

1,6% per l'eroina,
7% per la cocaina,
32% per la cannabis

popolazione studentesca (15-19 anni) - ESPAD



2,1% per l'eroina
5,9% per la cocaina
31,5% per la cannabis

POPOLAZIONE GENERALE



STUDENTI





EROINA



COCAINA



CANNABIS





POPOLAZIONE GENERALE



STUDENTI



STIMOLANTI



ALLUCINOGENI



I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.1 Consumi di eroina

EROINA: Tre sottolineature

POP. GENERALE

- Il consumo è del 1,6%, almeno una volta nella vita e solo lo 0,1% consuma frequentemente
- Prevalente l'uso nel sesso maschile
- Ripresa dei consumi

Figura I.1.1: Consumo di **eroina** nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni) - Anni 2007 - 2008




Figura I.1.2: Consumo di **eroina** nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2008





Figura I.1.3: Consumo di **eroina** nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età



I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga
nella popolazione generale

I.1.1.2 Consumi di cocaina

COCAINA: Tre sottolineature

POP. GENERALE

- Il consumo è del 7%, almeno una volta nella vita
- Circa il doppio rispetto alla media europea
- Più alto l'uso nel genere femminile rispetto all'eroina

Figura I.1.5: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni)







Figura I.1.6: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2008



Trend in aumento nella popolazione generale



Figura I.1.7: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) nei vari paesi europei. Anni 2001 - 2008




Figura I.1.8: Consumo di **cocaina** nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi).
Distribuzione per genere e classi d'età





Figura I.1.9: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)



I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.3 Consumi di cannabis

CANNABIS: Tre sottolineature

POP. GENERALE

- 32% della popolazione generale ha usato cannabis, almeno una volta nella vita
- 6,9 % negli ultimi 30 gg ma l'1,34% la utilizza frequentemente
- Più alto il consumo di cannabis nella popolazione italiana rispetto alla media europea

Figura I.1.10: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni)






Figura I.1.11: Consumo di **cannabis** nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2008






Figura I.1.12: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) nei vari paesi europei. Anni 2001 - 2008




Figura I.1.13: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età





Figura I.1.14: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di **cannabis** nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)



I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.4 Consumi di stimolanti

STIMOLANTI: Tre sottolineature

POP. GENERALE

- 3,8 % della popolazione generale ha usato stimolanti (amfetamine, ecstasy, GHB, ecc.), almeno una volta nella vita
- 0,04 % uso frequente negli ultimi 30 gg
- Più basso l'uso di stimolanti nella popolazione italiana rispetto alla media europea

Figura I.1.15: Consumo di **stimolanti** nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)




Figura I.1.16: Consumo di stimolanti nella popolazione generale negli ultimi 12 mesi




Figura I.1.17: Consumo di **stimolanti** nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età





Figura I.1.18: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di **stimolanti** nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)



I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.5 Consumi di allucinogeni

ALLUCINOGENI: tre sottolineature

POP. GENERALE

- 3,5 % della popolazione generale ha usato allucinogeni almeno una volta nella vita
- 0,04 % uso frequente negli ultimi 30 gg

Figura I.1.19: Consumo di **allucinogeni** nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni)







Figura I.1.20: Distribuzione percentuale della frequenza di utilizzo fra i consumatori di allucinogeni nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)



Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga
nella popolazione generale, 15-64 aa

I.1.1.6 Policonsumo

- Forte tendenza al policonsumo:

POP. GENERALE

- Consumatori di **cannabis**:

- 12,7% anche **cocaina**
- 3,1% anche **eroina**

- Consumatori di **cocaina**:

- 84,8% anche **cannabis**
- 14,6% anche **eroina**

- Consumatori di **eroina**


- 76,8% anche **cannabis**
- 51,8% anche **cocaina**

NB: Forte associazione con alcol e tabacco a tutte le sostanze

Tabella I.1.1: Distribuzione della prevalenza condizionata di **policonsumatori** nella popolazione generale 15-64 anni negli ultimi 12 mesi

Sostanze	Alcol	Tabacco (\geq sigaretta/die)	Cannabis	Cocaina	Eroina
Cannabis	98,9	58,9	-	12,7	3,1
Cocaina	97,6	73,8	84,8	-	14,6
Eroina	87,3	66,7	76,8	51,8	-

Figura I.1.42: Poliassunzione (dati IPSAD - età 25–64 esclusa classe età 15-24)



I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani 15 – 19 aa (ESPAD condotto nell'anno 2008)

I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio ESPAD)

I.1.2.1 Consumi di eroina

EROINA: Tre sottolineature

GIOVANI

- Il consumo è del 2,1 % (VS 1,6% pop. gen.), almeno una volta nella vita e solo lo 0,3 % (VS 0,1% pop. gen.), consuma frequentemente
- Prevalente l'uso nel sesso maschile
- Trend dei consumi in diminuzione

Figura I.1.21: Consumo di **eroina** nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)




Figura I.1.22: Consumo di **eroina** nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età

maggior interessamento delle femmine nelle fasce più giovani rispetto a quelle più adulte




Figura I.1.23: Consumo di **eroina** nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi).
Anni 2000 - 2008




Tabella I.1.2: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di **eroina** una o più volte negli ultimi 12 mesi - ESPAD

Eroina	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	1,58	1,59	0,01	0,7
Femmine	1,2	1,0	0,2	-14,4
Totale	1,4	1,3	0,1	-7,9

Figura I.1.24: Distribuzione della frequenza di consumo fra i consumatori di eroina nella popolazione studentesca (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

