

2.3

RISULTATI DEL TRATTAMENTO CON DAAS DI II GENERAZIONE DI UNA PARTICOLARE COHORTE DI PAZIENTI, AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS C, AVENTI COME CARATTERISTICA COMUNE LA TOSSICODIPENDENZA: CASISTICA PERSONALE

Vincenzo Iovinella*, Clara Baldassarre**, Fabio Curcio**, Marco Topa, Ferdinando Macri***, Carmine Mazzella****, Paola Bellomunno****, Stefano Vecchio****

* Responsabile del Centro Prescrittore dei farmaci ad alto costo per la cura dell'HCV, P.O. San Paolo, ASL Napoli 1 Centro,

** SERD 25, *** SERD 27, **** SERD 24

Premessa

Dall'aprile 2015 la Campania ha cominciato la dispensazione dei nuovi farmaci per la cura dei pazienti affetti da malattia cronica HCV correlata, con grado di fibrosi F3 ed F4, i DAAs (antivirali ad azione diretta) di II generazione e successivamente le linee guida nazionali hanno virato verso l'eradicazione dell'epatite da virus C aprendo il trattamento a tutti i soggetti infetti con ogni grado di fibrosi. In questo lavoro si riportano i dati di un sottogruppo di pazienti, tossicodipendenti, trattati presso il Centro Prescrittore dei farmaci ad alto costo per la cura dell'HCV del P.O. San Paolo, ASL NAPOLI 1 CENTRO.

Popolazione

I pazienti afferenti al nostro Centro, provenienti dai SERT cittadini, sono stati 255 ed hanno rappresentato il 24,2% della casistica generale. Le caratteristiche generali del gruppo hanno mostrato un'età media di 52 anni, nettamente inferiore alla popolazione complessiva del Centro (64), le femmine sono state 30 mentre la popolazione maschile era costituita da 225 persone. I sottotipi più rappresentati sono stati il genotipo 1a (103) ed il genotipo 3 (101). I Pazienti erano tutti in trattamento sostitutivo e non è stato necessario nessun aggiustamento posologico.

Risultati

I risultati come si evince dalle tabelle 1 e 2 sono stati molto lusinghieri: nell'ambito del trattamento solo 5

pazienti hanno relapsato di cui uno si è reinfezzato. In tabella riportiamo dati dei pazienti trattati con i sottogruppi dei pazienti trattati con i farmaci attualmente più utilizzati.

Tabella 1

ETÀ MEDIA	52	VIREMIA	1273500	FIBROSI	15,1
MASCHI	225	FEMMINE	30		
GENOTIPO 1	103	GENOTIPO 2	2		
GENOTIPO 3	101	GENOTIPO 4	15		

Tabella 2

	VIREMIA	FIBROSI	GENOTIPO	GPT(F.T.)	PLT
PRIMA DI GIUGNO 2015	1866315	14,3	TUTTI	43	183000
DOPO GIUGNO 2015					
EPCLUSA	2458000	10,3	1	38	176125
	2560000	21	3	72	111282
MAVIRET	4560000	5	1	28	148156
	1600000	7	3	38	116000

Conclusioni

Sono stati riportati i dati di 255 soggetti tossicodipendenti (225 M e 30 F). I farmaci di ultima generazione utilizzati hanno avuto come caratteristica la brevità (56 giorni) o la semplificazione (1 cp per 84 giorni). Come si vede dalle tabelle l'apertura a tutte le categorie ha comportato una riduzione dell'età media, ed un innalzamento delle medie delle viremie. L'eradicazione in questa particolare categoria di pazienti è stata raggiunta grazie al lavoro di equipe che si è instaurato fra lo specialista epatologo ed il team degli operatori dei SERT attraverso un apposito protocollo di intesa autorizzato dalla Direzione Centrale dell'ASL Napoli 1 Centro.