

ESPERIENZE DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE CON NUOVE FORMULAZIONI NEL TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA OPPIACEI

STATO DELL'ARTE DELL'UTILIZZO DI METADONE COMPRESSE

Bergamo. XII congresso nazionale FeDerSerD. Dott. Paolo Donadoni SerD Bergamo




DATI SER.D BERGAMO

- 740 pz dal 01/01/2023 al 19/10/2023 diagnosi di DUS da oppioidi che accedono al servizio
- 549 sono tra questi in cura con metadone sciroppo
- 26 sono tra questi in cura con metadone compresse (primo paziente arruolato il 31/03/23)
- Inizialmente acquistato in modalità CNN (Classe C Non Negoziabile - allora disponibili anche le cp da 5 mg)
- Tutti i pazienti arruolati sono passati dallo sciroppo alle compresse
- Formulazioni utilizzate in questo momento: 10 mg - 20 mg – 40 mg – 60 mg
- Ultimo mese 23 pazienti = 50 mg media (range 5-120 mg). Affidamento 18,4 gg media (range 6-27 gg)
- 17♂ e 6 ♀(35% ♀)


DATI SER.D BERGAMO

- I dosaggi iniziali di metadone compresse sono rimasti i medesimi di quelli assunti con la formulazione in sciroppo
- Stesso discorso per la durata del periodo di affidamento farmacologico
- Un paziente è stato riportato alla formulazione sciroppo per tentativo di diversione
- Lo switch è stato proposto, dal Ser.D., nella quasi totalità dei casi, a pazienti già complianti al trattamento precedente. Tendenzialmente la proposta è stata formulata per i vantaggi intrinseci in tale cura (viaggi aerei con problemi per le formulazioni liquide, meno stigma per le assunzioni in compresse rispetto allo sciroppo, praticità di trasporto)
- Frazionamento giornaliero della terapia

RILEVAZIONE CUSTOMER I



RILEVAZIONE CUSTOMER II



DIVERSIONE/MISUSO

- Problema trasversale indipendente dalla tipologia di formulazione dei farmaci oppioidi, ma anche caratteristica intrinseca in ogni farmaco e non solo degli agonisti oppiacei
- Sicuramente le compresse si prestano al possibile misuse (per es. la via nasale, con potenziali rischi legati al rapido assorbimento del farmaco ed alla elevata biodisponibilità del componente attivo). UK non ha autorizzato la vendita di questa formulazione per tale motivo
- La tipologia dei blister si può migliorare, specie per il rischio di assunzioni accidentali per i bambini, child-proof (mai abbastanza le raccomandazioni ai pazienti sulla corretta conservazione dei farmaci, specie se hanno minori in casa).
Questione LASA
- Abbiamo preferito scegliere pazienti con adeguata adesione al trattamento, riportandoli alla formulazione con sciroppo in caso di comportamenti inadeguati

PROGETTO CO.ME.STA.TE.

- Studio osservazionale sul metadone in compresse al quale i SerD e gli SMI presenti al congresso sono invitati a partecipare
- Tutte le informazioni sono reperibili al desk Ce.R.Co - FeDerSerD. presente nell'atrio del centro congressi. E' possibile aderire immediatamente al progetto
- Lo studio è già iniziato e sono già stati raccolti alcuni dati; tra questi ce ne sono di analoghi a quelli proiettati nelle diapositive precedenti, ma ne sono presenti anche altri, molto interessanti, ad esempio sulla comorbidità con malattie psichiatriche, internistiche e neurologiche