




MEDICINA DELLE DIPENDENZE
Policlinico di Verona




Palermo, FederSerD 2016

***Di quale benzodiazepina abusano i TD
in trattamento sostitutivo oppioide?***

Fabio Iugoboni

Pericolosità delle droghe: un'analisi personale e sociale

David J Nutt, Independent Scientific Committee on Drugs. *Lancet*, 2010



DIVERSITA' di EFFICACIA dei farmaci ANTIDEPRESSIVI e delle BENZODIAZEPINE nei vari DISTURBI d'ANSIA

- DISTURBO POST-TRAUMATICO da STRESS

- DISTURBO d'ANSIA indotto da SOSTANZE

- DISTURBO d'ANSIA GENERALIZZATO


- FOBIA SOCIALE

- DISTURBO da attacchi di PANICO

- FOBIA SPECIFICA


- DISTURBO ACUTO da STRESS

- DISTURBO d'ANSIA dovuto a causa nota



La prevalenza è
variabile tra
**0,4% in
Inghilterra e
Galles e 12,9 %
in Estonia.**

Fig. 3. Annual prevalence of non medical use of tranquillizers and sedatives among the general population in high-prevalence countries



Source: United Nations Office on Drugs and Crime, data from the annual report questionnaire (2007-2011).

Ricoveri Medicina delle Dipendenze – 2003-2016

Tipo di BZD	<u>TD*</u>	<u>%C</u>	OS**	<u>%C</u>	Totale	<u>T%</u>
lormetazepam	61	61,6	46	55,4	426	56,1
lorazepam	12	12,1	10	12,1	106	13,9
alprazolam	8	8,1	9	10,8	69	9,1
zolpidem	5	5,1	5	6,0	54	7,1
altre BZD	13	13,1	13	15,7	105	13,8
TOTALE	99	100,0	83	100,0	760	100,0

* 13% (99/760) dei ricoverati sono TD in terapia oppioide agonista

** 11% (83/760) sono operatori sanitari (OS)

Medicina delle Dipendenze

Detossificazioni da BDZ 2003 - 2016 (aprile)

<i>Tipo di BZD</i>	<i>N</i>	<i>%</i>	<i>Mesi abuso quotidiano (media)</i>	<i>Dose media (mg)</i>	<i>N° volte DDD media</i>	<i>EDD (mg)</i>	<i>Dose max (mg)</i>
Lormetazepam	469	56,6	76	69	69	345	650
Lorazepam	106	12,8	113	40	16	400	400
Alprazolam	79	9,5	89	17	17	340	50
Zolpidem	62	7,5	49	530	53	265	1800
Bromazepam	27	3,3	49	120	12	120	800
Diazepam	20	2,4	70	92	9	91	300
Altre BZD	66	7,9	nd	nd	nd	nd	nd
Totale	829	100					


Lormetazepam Addiction

Lara Magro¹, Marco Faccini², Roberto Leone¹

¹Pharmacology Unit, University of Verona, Verona, Italy; ²Department of Internal Medicine, Addiction Unit, University Hospital of Verona, Verona, Italy

TABLE 4 Benzodiazepine Abuse/Dependence/Addiction Reports in the Italian Adverse Drug Reactions Database

Drug	N
Lormetazepam ^a	
Bromazepam	
Zolpidem	
Alprazolam	
Diazepam	
Triazolam	
Delorazepam	
Lorazepam	
Temazepam	
Other	
TOTAL	1



^aIn 16 reports the pharmacist report it is tablets, and in the

Perché il lormetazepam (*Minias*®)?



- Ristretto intervallo terapeutico (farmaco molto potente, 20 gocce dose massima raccomandata)
- In soluzione alcolica (l'alcol al 95%, 20 ml per flacone, aggiunge potenza additiva)
- Il buon sapore delle gocce e la spiccata tendenza all'assunzione sublinguale
- Breve emivita e marcata tolleranza
- Marcato effetto picco (curva ascendente/forte rinforzo positivo)
- Marcato effetto negativo (curva discendente/forte rinforzo negativo)

Vengono segnalate le ADR legate a fenomeni di abuso/dipendenza?

SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR)					
A cura dei medici e degli altri operatori sanitari. Inviare al responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza (gli indirizzi dei responsabili possono essere recuperati nel sito dell'AIFA: www.agenziafarmaco.it/it/responsabili)					
1. INIZIALI PAZIENTE Nome - Cognome	2. DATA di NASCITA o ETÀ	3. SESSO M ☐ F ☐	4. DATA INSORGENZA REAZIONE	5. ORIGINE ETNICA	CODICE SEGNALAZIONE
1.a. PESO (kg)	1.b. ALTEZZA (cm)	1.c. DATA ULTIMA MESTRUAZIONE	1.d. GRAVIDANZA ☐ 1° trimestre ☐ 2° trimestre ☐ 3° trimestre	☐ sconosciuta	1.e. ALLATTAMENTO ☐ SI ☐ NO
6. DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI (*se il segnalatore è un medico)					
7. INDICARE SE LA REAZIONE OSSERVATA DERIVA DA: ☐ INTERAZIONE ☐ ERRORE TERAPEUTICO ☐ ABUSO ☐ MISUSO ☐ OFF LABEL ☐ OVERDOSE ☐ ESPOSIZIONE PROFESSIONALE					
8. GRAVITA' DELLA REAZIONE: GRAVE ☐ DECESSO ☐ OSPEDALIZZAZIONE ☐ INVALIDITA' GRAVE O PERMANENTE ☐ HA MESSE IN ALLERTE ☐ ANOMALIE CONGENITE/DEFICIT NEL NEONATO ☐ ALTRE ☐ NON GRAVE					

VigiFarmaco

Accedi

Italiano Set your language. ▼

Aiutaci a rendere i farmaci più sicuri.

Invia una segnalazione di reazione avversa

(che hai sperimentato in prima persona o di cui sei a conoscenza)

3G

Sistema Socio-Sanitario  Regione Lombardia
ASL Cremona
Dipartimento Dipendenze
Servizio Territoriale Dipendenze
Nucleo Operativo Alcolologia

 **AREA
VIDEOSORVEGLIATA**
INFORMATICA DI SICUREZZA - 15.01.2012 - 15.01.2012 - 15.01.2012
Il presente avviso è posto in esecuzione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 196 del 6/06/2003 (Codice Privacy) e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 196 del 6/06/2003 (Codice Privacy).
La presente area è sottoposta a videosorveglianza e l'accesso è riservato ai soli dipendenti della ASL Cremona.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla sicurezza e alla protezione dei beni della ASL Cremona.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla sicurezza e alla protezione dei beni della ASL Cremona.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla sicurezza e alla protezione dei beni della ASL Cremona.

FERMIAMO
LO SPACCIO DI
MINIAS DELLE FARMACIE
CHÈ LO VENDONO DA ANNI
SENZA RICETTA



Grazie dell'ascolto

“Tutte le
castronerie
originano da
ottime intenzioni”
(*Wilde*)

Tel. 0458128291 // 92

www.medicinadipendenze.it

fabio.lugoboni@ospedaleuniverona.it