

ANAMNESI E TRATTAMENTO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN DOPPIA DIAGNOSI

	DIAGNOSI PSICHIATRICA CODIFICATA	DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTI ANORMALI NON CODIFICABILI
DIAGNOSI DI DIPENDENZA	1 Vera e propria doppia diagnosi	2 Dipendenza con disturbi psichiatrici
ABUSO DI SOSTANZE O ALTRI USI PROBLEMATICI	3 Patologia psichiatrica con abuso di sostanze	4 Condizioni non codificate

ANAMNESI DI TOSSICODIPENDENZA





- MODULO ANAGRAFICO
- MODULO SITUAZIONE LEGALE
- ANAMNESI
- ESAME OBIETTIVO (ESAME APPARATI ORGANICI)
- ESAME PSICHICO
- DATI ANAGRAFICI (SOGGETTO, GENITORI, FRATELLI E SORELLE)
- CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE E ABITATIVE
- ATTIVITA' LAVORATIVA
- DATI CLINICI E INFETTIVIOLOGICI (TEST HIV, MARKERS EPATITE B,C)
- DECORSO
- ESAME PSICHICO

One Step Drug Screen Test Device (urina)

Esecuzione del test:

- ➡ 1 Contenitore con campione di urina.
- ➡ 2. Prelevare una piccola quantità di urina con la pipetta e trasferire 3 gocce di urina (circa 100 microlitri in totale) nel pozzetto per il campione (S) del dispositivo di analisi.
- ➡ 3. Leggere i risultati dopo 5 minuti.





LION ALCOLMETER 600



```
*****
*****
*****
LION ALCOLMETER 600
S/N: T12028
CALIBRAZIONE
16:33:33 20/03/2013
CHECK CALIBRAZIONE:
09:08:42 19/05/201516
ESEGUI TEST
DATA: 10/02/2016
ORA: 11:53
N. TEST: 1690
UNITA: Promille (w/v)
RISULTATO: 0.00
ID OPERATORE
.....
COGNOME
.....
NOME
.....
ID SOGGETTO
.....
FIRMA SOGGETTO:
.....
FIRMA OPERATORE:
.....
*****
*****
*****
```

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO EROINOMANI



PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO ALCOLISTI



Regole per l'impiego del GHB

Dosi inferiori a 50 – 100 mg/kg frazionati a 3 – 6 volte per die

Impiego solo negli alcolisti "certi"

Stretta sorveglianza medica con visite settimanali

Affidare il farmaco ad un familiare del paziente



CONCLUSIONI

- Partire dal punto di vista del paziente piuttosto che da un sistema o una prospettiva teorica
- Devono sapere di poter cambiare
- Vedere quello che il paziente vuole diventare
- Anche se diamo al paziente il programma per così dire “su un piatto d’oro”, non significa che il paziente sia pronto ad aderire e a crederci