

ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

ESPERIENZA
TRATTAMENTALE
CON
BUPRENORFINA/
NALOXONE
16 MG/4 MG
IN UN SERD
MILANESE

Dott. Claudio Tomella

SERD
ASST FBF Sacco



ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

EFFICACIA

COMPLIANCE

ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE



Il Suboxone è un farmaco costituito da 4 parti di buprenorfina e 1 di naloxone ed è commercializzato in Italia sotto forma di compresse sublinguali da 2 e 8 mg e 16 mg

Le compresse da **2 mg**, contengono 2 mg di buprenorfina e 0,5 mg di naloxone

Le compresse da **8 mg**, contengono 8 mg di buprenorfina e 2 mg di naloxone

Le compresse da 16 mg, contengono 16 mg di buprenorfina e 4 di naloxone

ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE


The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE
N Engl J Med 2003;349:949-58.

ORIGINAL ARTICLE

Office-Based Treatment of Opiate Addiction with a Sublingual-Tablet Formulation of Buprenorphine and Naloxone

Paul J. Fudala, Ph.D., T. Peter Bridge, M.D., Susan Herbert, M.A., William O. Williford, Ph.D., C. Nora Chiang, Ph.D., Karen Jones, M.S., Joseph Collins, Sc.D., Dennis Raisch, Ph.D., Paul Casadonte, M.D., R. Jeffrey Goldsmith, M.D., Walter Ling, M.D., Usha Malkerneker, M.D., Laura McNicholas, M.D., Ph.D., John Renner, M.D., Susan Stine, M.D., Ph.D., and Donald Tusel, M.D., for the Buprenorphine/Naloxone Collaborative Study Group*

Numerosi studi hanno dimostrato sovrapposibilità pressoché globale per quanto attiene biodisponibilità, metabolismo ed efficacia terapeutica fra buprenorfina e buprenorfina/naloxone



ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

LA BUPRENORFINA:

- Assoluto profilo di sicurezza estrinseca ed intrinseca
- Assenza di un rischio cardiaco (non induce prolungamento QT)
- Efficace azione anti-depressione/disforia;
- Scarsa o nulla sedazione
- Ottimale neurocompensazione e un miglioramento delle capacità di vigilanza, attentive, mnesiche e di tutte le funzioni esecutive
- Possibilità di ampio utilizzo dell'affido domiciliare con rischio clinico scarso (anche nei confronti del misuse per via endovenosa);
- Migliore accettazione sociale da parte di pazienti e familiari (minore stigma);

OPIOID ADDICTION


Profilo multirecettoriale

Elevata affinità di legame

ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

Il naloxone è aggiunto in funzione anti-diversione/misuso:

- Biodisponibilità orale pressoché nulla,
- Biodisponibilità sublinguale trascurabile (max 3%),
- Biodisponibilità endonasale ed endovenosa del 100%



naloxone

ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

IL RAPIDO
RAGGIUNGIMENTO DI
DOSAGGI ADEGUATI
NELL'INDUZIONE
E UN OTTIMALE DOSAGGIO
NELLA STABILIZZAZIONE/
MANTENIMENTO,
DETERMINANO:

1. SCOMPARSA DEI SINTOMI
ASTINENZIALI
2. STABILITA' CLINICA
3. BUON CONTROLLO DEL
CRAVING



European Addiction
Research

Research Article

Impact of Buprenorphine Dosage on the Occurrence of Relapses in Patients with Opioid Dependence

Reimer J.^{a,b} · Vogelmann T.^c · Trümper D.^d · Scherbaum N.^e

 [Author affiliations](#)

Keywords: [> Claims data analysis](#) [> Opioid dependence](#) [> Opioid maintenance treatment](#) [> Buprenorphine](#)
[> Relapse](#) [> Dosage](#) [> Real-world evidence](#)

Eur Addict Res 2020;26:77-84

European
Addiction
Research

**Sono stati pubblicati negli ultimi anni
numerosi studi che hanno stressato il
concetto del dosaggio ottimale nella terapia
con buprenorfina e naloxone per aumentare
l'occupazione recettoriale, controllare il
craving e migliorare l'outcome**

Optimal dose of buprenorphine in opioid use disorder treatment: a review of pharmacodynamic and efficacy data

Peter Hjelmström  , Elin Banke Nordbeck & Fredrik Tiberg

Pages 1-7 | Received 01 Oct 2019, Accepted 10 Dec 2019, Published online: 08 Jan 2020

 Download citation  <https://doi.org/10.1080/03639045.2019.1706552>

 Check for updates



ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE



Drug and Alcohol Dependence

Volume 216, 1 November 2020, 108317

Adherence to buprenorphine: An analysis of prescription drug monitoring program data

Lia N. Pizzicato, Jeffrey K. Hom, Monica Sun, Caroline C. Johnson, Kendra M. Viner  


DRUG AND ALCOHOL Dependence

An International Journal on Biomedical
and Psychosocial Approaches



The College on Problems of Drug Dependence

ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE



ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

L'ESPERIENZA DEL SERD
ASST FBF-SACCO
CON COMPRESSE DI
BUPRENORFINA/NALOXONE
16 MG/4 MG

DAL 2018 AD OGGI SONO
STATI TRATTATI **20** PZ:
18 MASCHI
2 FEMMINE

ETA' MEDIA:
42.5 AA (RANGE 26-59)

16 PZ GIA' IN TERAPIA (nel
2018) CON DOSAGGI \geq 16
MG
10 CON 16 MG
6 CON DOSAGGIO $>$ 16



ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

L'ESPERIENZA DEL SERD
ASST FBF-SACCO
CON COMPRESSE DI
BUPRENORFINA/NALOXONE
16 MG/4 MG

AD OGGI:

18 PAZIENTI PROSEGUONO IL
TRATTAMENTO,

1 PAZIENTE HA INTERROTTO IL
TRATTAMENTO

1 PAZIENTE LO HA COMPLETATO



ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

MONITORAGGIO
TOSSICOLOGICO (ESAMI
URINE E/O MATRICE
CHERATINICHE):

14 PZ RISULTANO
NEGATIVI AGLI OPIACEI

6 PZ PRESENTANO
OCCASIONALI
POSITIVITA' AGLI
OPIACEI

12 PRESENTANO
POSITIVITA' ISOLATE
ALLA COCAINA



ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

AFFIDO

20 PZ RITIRANO IN AFFIDO

8 PZ: AFFIDO SETTIMANALE

9 PZ: AFFIDO QUINDICINALE

3 PZ: AFFIDO MENSILE

ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

LA FORMULAZIONE DI
COMPRESSE DI
BUPRENORFINA/NALOXONE
16 MG/4 MG:

- PUO' RISULTARE UNA MODALITA' PIU' EFFICACE IN RELAZIONE AL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA
- PUO' RIDURRE I POTENZIALI MISUSO E DIVERSIONE



EFFICACIA

ESPERIENZA TRATTAMENTALE CON BUPRENORFINA/NALOXONE 16 MG/4 MG IN UN SERD MILANESE

LA FORMULAZIONE DI
COMPRESSE DI
BUPRENORFINA/NALOXONE
16 MG/4 MG:

- PUO' MIGLIORARE LA COMPLIANCE E LA RITENZIONE IN TRATTAMENTO
- PUO' MIGLIORARE LA GESTIONE DEL FARMACO IN AFFIDO



Grazie per l'attenzione



DR. CLAUDIO TOMELLA

Dr. Claudio Tomella
SERD ASST FBF Sacco